

Exicort[®]

Spray nasale, sospensione
Mometasone Furoato



Exicort[®]

Spray nasale, sospensione
Mometasone Furoato

Congestione e Infiammazione: Impatto Clinico nelle Patologie delle Alte Vie Aeree




Indicazioni Exicort

- **Trattamento della febbre da fieno e della rinite perenne**
- **Poliposi nasale**


Rinite allergica stagionale

Exicort è efficace sulla congestione nasale



*P<0.001 vs placebo.
Berger et al. *Ann Pharmacother*. Nov 8, 2005.

Exicort è efficace già dalla seconda giornata




Gross et al. *J Allergy Clin Immunol*. 2007; 119 (Suppl 5):S64, Abstract 251.

Exicort riduce i sintomi oculari

- Prurito oculare
- Rossore oculare
- Lacrimazione

Singoli sintomi oculari

Variazione media rispetto al basale dei sintomi oculari totali e dei singoli sintomi valutati nei 15 giorni di studio in pazienti con TOSS ≥ 4



Exicort®

Spray nasale, sospensione
Mometasone Furoato

Molecole Indicate per il trattamento della Poliposi Nasale

- Mometasone Furoato
- Budesonide

Linee guida EAACI per la gestione della Poliposi Nasale

- Raccomandazioni per medici non specialisti:
 - Steroidi a uso topico
 - Irrigazioni nasali
 - Evitare antistaminici in pazienti allergici
- Raccomandazioni per Specialisti ORL :
 - Sintomi lievi
 - Steroidi a uso topico in forma spray
 - Sintomi moderati
 - Steroidi a uso topico in forma spray, steroidi a uso topico in gocce in associazione a steroidi orali per un breve periodo
 - Sintomi gravi
 - Trattamento chirurgico in associazione a steroidi orali per breve periodo



EAACI = European Academy of Allergology and Clinical Immunology.

EAACI, Rhinol Suppl. 2005;18:1.

Exicort[®]

Spray nasale, sospensione
Mometasone Furoato

Sicurezza di impiego

- Biodisponibilità sistemica $\leq 0.1\%$
- Nessun effetto sull'asse HPA
- Nessun effetto sulla crescita nei bambini
- Nessuna atrofia nasale

HPA = ipotalamo-ipofisi-surrene

*Van Cauwenberge et al. Allergy. 2000;55:116; Mometasone furoate[®] Prescribing Information.
At: <http://www.Mometasone-furoate.com>; Brannan et al. J Allergy Clin Immunol. 1996;97:198. Abstract 62;
Schenkel et al. Pediatrics. 2000;105:E22; Minshall et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 1998;118:648.*

Exicort: profilo di tollerabilità negli adulti

INCIDENZA DI EVENTI AVVERSI IN 4 STUDI SULLA SAR[°]


Evento avverso	Mometasone furoato 200 µg od (n=494)	Placebo (n=497)
Cefalea	5%	5%
Faringite	3%	2%
Bruciore nasale	2%	3%
Starnuti	1%	3%
Epistassi	1%	2%

[°]Rinite Allergica Stagionale

Exicort sicuro nei bambini già dai **3 anni**

Exicort: nessun ritardo della crescita a lungo termine nei bambini

Velocità di crescita in altezza (stadiometro calibrato)



Schenkel et al. *Pediatrics*. 2000;105:E22.

Exicort[®] *Spray nasale, sospensione* *Mometasone Furoato*

Posologia Exicort

Trattamento della febbre da fieno e della rinite perenne

Uso nei bambini dai 3 agli 11 anni di età

La dose raccomandata è 1 spruzzo in ciascuna narice una volta al giorno.

Uso negli adulti e bambini al di sopra dei 12 anni di età

La dose raccomandata è 2 spruzzi in ciascuna narice una volta al giorno.

Polipi nasali

Uso negli adulti al di sopra dei 18 anni di età

La dose iniziale raccomandata è 2 spruzzi in ciascuna narice una volta al giorno.

Se i sintomi non sono controllati dopo 5 o 6 settimane la dose può essere aumentata a 2 spruzzi in ciascuna narice due volte al giorno.

